

症例① 80歳代男性

X-2年に実施した横行結腸がん術後フォローで通院中
腰と背中の痛み精査目的で院内他科紹介となった。

	基準範囲	測定値
RBC	(435-555×10 ⁴ /μL)	325
Hb	(13.7-16.8 g/dL)	10.8
Ht	(40.7-50.1 %)	32.3
MCV	(83.6-98.2 fL)	99.4
MCH	(27.5-33.2 pg)	33.2
MCHC	(31.7-35.3 %)	33.4
網赤血球	(0.5-2.5 %)	0.8
血小板	(15.8-34.8×10 ⁴ /μL)	9.8
白血球	(3300-8600 /μL)	4200
目視]桿状核球	(%)	0
分葉核球	(%)	60.0
単球	(%)	3.0
好酸球	(%)	1.0
好塩基球	(%)	0.0
リンパ球	(%)	36.0
CRP	(<0.14 mg/dL)	0.17
PT	(10.5-12.7 秒)	14.2
PT対照		1.13
APTT	(23.7-34.8 秒)	34.2
APTT対照		27.8
フィブリノーゲン	(207-417 mg/dL)	333
D-dimer	(0.0-0.9 μg/mL)	7.9
尿素窒素	(8-20 mg/dL)	30.5
クレアチニン	(0.65-1.07 mg/dL)	1.38
尿酸	(3.7-7.8 mg/dL)	7.2
血糖	(73-109 mg/dL)	112
コリンエステラーゼ	(240-486 U/L)	174
総コレステロール	(142-248 mg/dL)	124
ヘモグロビンA1c	(4.9-6.0 %)	6.0

	基準範囲	測定値
総蛋白	(6.6-8.1 g/dL)	11.9
アルブミン	(4.1-5.1 g/dL)	3.1
グロブリン	(2.2-3.4 g/dL)	8.8
LD	(124-222 U/L)	179
AST	(13-30 U/L)	14
ALT	(10-42 U/L)	11
総ビリルビン	(0.4-1.5 mg/dL)	0.68
直接ビリルビン	(0.0-0.2 mg/dL)	0.12
γ-GT	(13-64 U/L)	12
ALP	(38-113 U/L)	106
CK	(59-248 mg/dL)	40
アミラーゼ	(44-132 U/L)	87
Na	(138-145 mmol/L)	136
K	(3.6-4.8 mmmol/L)	4.1
Cl	(101-108 mmmol/L)	101
Ca	(8.8-10.1 mg/dL)	10.0
P	(2.7-4.6 mg/dL)	3.7
尿一般検査		
外観		黄色
比重	(1.005-1.030)	1.029
蛋白	(-)	(+)
糖	(-)	(-)
潜血	(-)	(-)
赤血球	(個/×400)	1.4
白血球	(個/×400)	1.0
円柱	(-)	(-)
HBs抗体	(0.00-9.99 mIU/mL)	2.07
HBc抗体	(0.00-0.99 S/CO)	1.18
HBV-RNA定量	(-)	(-)